CO₂ レーザー治療同意書(いぼ・ほくろ)

みよたファミリークリニック 院長 堀口 哲男

患者番号: 氏名:

CO₂ レーザー治療について、以下の説明を十分に受けています。

- 1) この治療は、炭酸ガスレーザー照射により瞬間的に皮膚表面を蒸散させ、いぼ・ほくろ等の隆起性病変を除去することを目的とした治療です。
- 2) 通常1度の治療で切除されますが、症状によっては2回以上の治療が必要な場合もあります。原則として、通院は不要です。
- 3) 出血はほとんどありません。
- 4) 術後多少赤みが残りますが、やがてかさぶたになり、 $1\sim2$ 週間後には自然に剥がれます。症例によっては、かさぶたが剥がれてから約3ヶ月は傷の凹みが残る場合があります。
- 5) 治療後、傷の凹みがなくなり、治療部位が目立たないようになるには約6ヶ月程度かかります。
- 6) 原則として治療部位の発赤が取れるまでの期間はその部位の再照射・切除ができません。
- 7) 治療部位の大きさにより違いはありますが、おおよその治療時間は1部位あたり3~5分程度です。
- 8) 治療は局所麻酔を行いますので、術中の痛みはほとんどありません。
- 9) ケロイド体質 (肥厚性瘢痕が出来やすい体質) の方には、内服薬、外用剤をオプションで使用して頂きます。
- 10) 当日は患部を濡らさないようにご注意ください。シャワー、入浴は翌日から可能です。
- 11) 照射後赤みや痛みが出ることもあります。部位によってはクリームまたは軟膏を処方しますので、医師の指示に従い塗布して下さい。
- 12) 個人差によりレーザー治療後の炎症性色素沈着が一時的に生じる事がありますが、通常3~6月できれいになります。
- 13) 大きなほくろ、開いた傷、もしくは皮膚疾患のある箇所は治療を行わないことがあります。
- 14) 治療の経過により、発赤、水泡、痂皮を形成した場合は必要な治療を行いますので、当院の指示に従ってください。
- 15) ほくろは再発することがあります。これは、目に見えないほくろの細胞が 1 回の治療で取りきれなかった場合に起こります。(ほとんどの場合、3ヶ月以内に再発し、1年以上たってから再発することは非常にまれです。)

以上の1~15の内容につき理解しましたので、治療を受けることに同意いたします。

署名日:

保証人* 氏 名

(※治療を受ける者が未成年者の場合、保証人の欄に署名をお願い致します)